

(Para corroborar la autenticidad del presente ingrese esta clave en nuestra página Web: FrGUE7pfTT )

PROTOCOLO N° **111959**

hoja 1 de 3

Buenos Aires, viernes, 19 de febrero de 2016

Remitente: Aerolom Ind. y Com.de J.L.Zito

Muestra declarada Nieve de Cotillón Rey Momo

Identificación: L 830

Solicita: Test de Irritación Primaria Dérmica (Cod: 489)

Fecha Inicio de Ensayo: 16/02/2016

Fecha de terminación del ensayo: 19/02/2016

Nota: El muestreo fue realizado por el remitente.

## MÉTODO:

De acuerdo al método de "OECD Guideline for the testing of chemicals 404 adopted 24th April 2002", se usaron 2 ó 3 conejos albinos, machos o hembras, de peso corpóreo de 2 a 3 kg. 24 horas antes del ensayo se rasura una superficie en el lomo de 2,5 x 2,5 cm. Se aplica 0.5 g de la muestra el primer día del ensayo a cada conejo en la zona rasurada y luego de 24 hs se retira la misma. Luego de 60 min. de la aplicación se procede a las lecturas de las lesiones dérmicas. A las 24, 48 y 72 horas de iniciado el ensayo se realizan nuevas lecturas. Los animales fueron mantenidos durante todo el período de prueba en jaula individuales a temperatura de 20° C + / - 3° C y humedad relativa entre 30 % y 70 %. El régimen de luz fue de 12 hs de luz y 12 hs de oscuridad. Para la alimentación de los conejos se utilizo alimento convencional de laboratorio con acceso irrestricto al agua.

## CONSIDERACIONES:

La guía 404 del año 2002 establece en su punto 20 que si se usan dos conejos y en ambos se obtienen la misma respuesta, no es necesario continuar con el test. Si las respuestas son diferentes se debe seguir evaluando usando conejos adicionales.

Si bien la OECD establece que la muestra se deja en la piel de los conejos solo 4 hs., dado que la muestra, por estudios bibliográficos de sus componentes, tiene muy altas chances de no ser irritante, y con el objeto de proteger más al consumidor, la muestra se deja aplicada 24 hs en los animales.

En cuanto a la aplicación de la muestra si ésta es líquida se la hace con una gaza embebida en la misma y si no lo es se aplica directamente sobre la piel.

Dado que la técnica de la OECD solo da una tabla con los grados de lesiones en la piel y no emite una clasificación del grado de irritación obtenido y aprovechando que dicha tabla es idéntica a la tabla de grados de lesiones en la piel de la técnica de J.H. Draize se incluye como una guía más la clasificación que se obtendría según el test de Draize. (Apraisal of the safety of chemicals in foods, drugs and cosmetics. 1965)

## DEFINICIÓN:

Irritación dérmica es la producción de un daño reversible en la piel luego de la aplicación en la piel por más de 4 hs. de la sustancia en estudio.

**La muestra fue aplicada:** Sin parche oclusivo

PROTOCOLO N° **111959**

hoja 2 de 3

Buenos Aires, viernes, 19 de febrero de 2016  
Remitente: Aerolom Ind. y Com.de J.L.Zito  
Muestra declarada Nieve de Cotillón Rey Momo

Identificación: L 830  
Solicita: Test de Irritación Primaria Dérmica (Cod: 489)  
Fecha Inicio de Ensayo: 16/02/2016 Fecha de terminación del ensayo: 19/02/2016  
Nota: El muestreo fue realizado por el remitente.

Fecha de aplicación de la muestra: 16/02/2016

| LESIONES DÉRMICAS EN CONEJOS |    |          |   |          |   |     |     |
|------------------------------|----|----------|---|----------|---|-----|-----|
|                              |    | Conejo 1 |   | Conejo 2 |   | n/a |     |
| Fecha de lectura             | Hs | macho    |   | macho    |   | n/a |     |
|                              |    | A        | B | A        | B | A   | B   |
| 16/02/2016                   | 1  | 0        | 0 | 0        | 0 | n/a | n/a |
| 17/02/2016                   | 24 | 0        | 0 | 0        | 0 | n/a | n/a |
| 18/02/2016                   | 48 | 0        | 0 | 0        | 0 | n/a | n/a |
| 19/02/2016                   | 72 | 0        | 0 | 0        | 0 | n/a | n/a |
| Promedios                    |    | 0.00     |   | 0.00     |   | n/a |     |

| EVALUACION DE LAS LESIONES  |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| A - FORMACIÓN DE ERITEMAS Y | B - FORMACIÓN DE EDEMAS |
| 0: ausencia de eritema      | 0: ausencia de edema    |
| 1: muy ligero eritema       | 1: muy ligero edema     |
| 2: bien definido eritema    | 2: bien definido edema  |
| 3: moderado eritema         | 3: moderado edema       |
| 4: severo eritema           | 4: severo edema         |

**OBSERVACIONES:**

**RESULTADO SEGÚN LA OECD GUIDELINE FOR TESTING CHEMICAL 404:**  
(Adopted 24 th April 2002)

De acuerdo a los resultados obtenidos la muestra no es irritante

PROTOCOLO N° **111959**

hoja 3 de 3

Buenos Aires, viernes, 19 de febrero de 2016

Remitente: Aerolom Ind. y Com.de J.L.Zito

Muestra declarada Nieve de Cotillón Rey Momo

Identificación: L 830

Solicita: Test de Irritación Primaria Dérmica (Cod: 489)

Fecha Inicio de Ensayo: 16/02/2016

Fecha de terminación del ensayo: 19/02/2016

Nota: El muestreo fue realizado por el remitente.

Se incluye como una guía más la clasificación que se obtendría según el test de Draize. (Apraisal of the safety of chemicals in foods, drugs and cosmetics. 1965)

| Clasificación según Draize |
|----------------------------|
| No irritante 0             |
| Pract. No irrit 0.1 - 0.99 |
| Mínim. Irritan 1.0 - 1.99  |
| Moder. Irritar 2.0 - 5.99  |
| Sever. Irritan 6.0 - 8     |

| CLASIFICACIÓN QUE SE OBTENDRIA SEGÚN DRAIZE J.H. |              |
|--|--------------|
| 0.00   | No irritante |



**Dr. David Sapoznikow**

**M.N. 1182-b**